

Protocolo: **7658479616**
Nome: **MARCIO CARVALHO DA SILVA**
Dt. Nasc: **05/12/1975**

Data: **09/06/2025**
Unidade: **CHACARA FLORA**



00031NNSOW00L08L

ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DAS CARÓTIDAS E ARTÉRIAS VERTEBRAIS

Foram avaliadas as carótidas comuns, bulbos carotídeos, carótidas internas e externas bilateralmente.

As carótidas apresentam trajeto habitual, sem sinais de acotovelamentos, com paredes lisas e espessura normal.

Placas ateromatosas fibroadiposas, homogêneas, de superfície regular, na região do bulbo carotídeo direito (0,21 cm de espessura) e em origem da carótida interna à esquerda (0,24 cm de espessura) sem repercussão hemodinâmica.

A espessura mediointimal média da carótida comum direita é 0,60 mm.
A espessura mediointimal média da carótida comum esquerda é 0,60 mm.

A análise espectral identificou fluxos com morfologia preservada e velocidades normais em todos os segmentos estudados.

As velocidades de fluxo aferidas foram:*

	VPS cm/s	VD cm/s	VPS CI / VPS CC	VPS CI / VDFCC	VDF CI / VDF CC
Carótida Comum - Direita	72	20			
Carótida Comum - Esquerda	87	25			
Carótida Interna - Direita	45	20	0.6	2.3	1.0
Carótida Interna - Esquerda	56	21	0.6	2.2	0.8

As artérias vertebrais foram avaliadas entre as apófises transversas, bilateralmente.

O fluxo detectado é anterógrado com velocidades dentro dos parâmetros normais.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA

Estenose menor que 50% em bulbo direito e em artéria carótida interna esquerda.

Laudado por:
DRA. YOEMI UEHARA
CRM:83791

Este laudo foi assinado eletronicamente.

Atenção:

O valor preditivo de qualquer exame depende de análise conjunta do seu resultado e dados clínico-epidemiológicos do(a) paciente

Protocolo: **7658479616**
Nome: **MARCIO CARVALHO DA SILVA**
Dt. Nasc: **05/12/1975**

Data: **09/06/2025**
Unidade: **CHACARA FLORA**



0003INNSOW00L08L

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DAS ESTENOSES *

% Estenose (NASCET)	VPS cm/s	VDF cm/s	VPS CI / VPS CC	VPS CI / VDF CC	VDF CI / VDF CC
< 50%	< 140	< 40	< 2,0	< 8	< 2,6
50 – 59%	140 – 230	40 – 69	2,0 – 3,1	8 – 10	2,6 – 5,5
60 – 69%		70 – 100	3,2 – 4,0	11 – 13	
70 – 79%	> 230	> 100	> 4,0	14 – 21	
80 – 89%		> 140		22 – 29	> 5,5
> 90%	> 400		> 5,0	> 30	
Suboclusão	Variável fluxo filiforme	Variável fluxo filiforme	Variável fluxo filiforme	Variável fluxo filiforme	Variável fluxo filiforme
Oclusão	Ausência de fluxo	Ausência de fluxo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

 As cores representam, da esquerda para a direita, os critérios mais relevantes.

*Albricker et al. DIC, CBR, SBACV – 2023. Arq Bras Cardiol. 2023;120(10)

Tabela Adaptada do Estudo CAPS para Espessura Médio-Intimal (mm)

Sexo Masculino

Idade (anos), percentil	25	35	45	55	65	75	85
25%	0,515	0,585	0,634	0,680	0,745	0,814	0,830
50%	0,567	0,633	0,686	0,746	0,830	0,914	0,937
75%	0,633	0,682	0,756	0,837	0,921	1,028	1,208

Sexo Feminino

Idade (anos), percentil	25	35	45	55	65	75	85
25%	0,524	0,575	0,619	0,665	0,718	0,771	0,807
50%	0,567	0,615	0,665	0,719	0,776	0,820	0,837
75%	0,612	0,660	0,713	0,776	0,829	0,921	0,935

Lorenz et al. Stroke. 2006;37(1):87-92.
Freire et al. Arq Bras Cardiol: Imagem cardiovasc. 2015 Abril; 28(nº especial): e1-e64

Laudado por:
DRA. YOEMI UEHARA
CRM:83791

Este laudo foi assinado eletronicamente.

Atenção:
O valor preditivo de qualquer exame depende de análise conjunta do seu resultado e dados clínico-epidemiológicos do(a) paciente